



عنوان: استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

کد سند: ۲۹- NO

تاریخ ابلاغ: ۹۱/۱/۱

صفحه: ۱ از ۲

تاریخ بازبینی: ۹۲/۱/۱ یاد صورت ابلاغ دستورالعمل جدید

۱. هدف سند:

هدف از تدوین این سند، اعلام خط مشی‌ها، اهداف و روش‌های اجرایی و کنترلی مرتبط با استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی می‌باشد.

۲. مخاطبین:

کلیه کارکنان کادر درمانی و خدمات و لنثری

۳. مسئولیت‌ها:

مسئولیت اجرای این سند بر عهده سرپرستار بخش می‌باشد.
مسئولیت نظارت بر اجرای این سند بر عهده سوپروایزر کنترل عفونت، سوپروایزر بالین و سوپروایزر آموزشی بیمارستان می‌باشد.

- مسئولیت بازنگری این سند بر عهده سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان می‌باشد.
- مسئولیت تصویب سند بر عهده ریاست بیمارستان می‌باشد.

۴. خط مشی:

• اهداف خط مشی:

۱. حفظ سلامت فردی کارکنان کادر درمانی، خدمات، لنثری

پیشگیری از انتقال عفونت‌ها به کارکنان کادر درمانی، خدمات، لنثری
خط مشی: با عنایت به اهمیت احتیاط‌های استاندارد و لزوم رعایت این احتیاط‌ها جهت مراقبت از تمام بیماران، کارکنان تیم درمان در این مرکز ملزم هستند هنگام ارائه خدمات به بیماران نکاتی که باید در زمان تماس با خون، تمام مایعات بدن، ترشحات، مواد دفعی (بدون در نظر گرفتن این نکته که حاوی خون قابل رویت هستند یا نه) پوست آسیب دیده و مخاط‌ها رعایت گردد.
۵. روش اجرا:

۱. وسایل حفاظت فردی به مقدار مناسب پیش‌بینی و در بخش‌های مربوطه موجود است.

۲. کارکنان کادر درمانی در باره اهمیت استفاده از وسایل حفاظت فردی، نحوه پوشیدن و درآوردن وسایل فوق تحت

آموزش مستمر سالیانه قرار دارند.



عنوان: استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

کد سند : ۲۹- NO

تاریخ ابلاغ : ۹۱/۱/۱

صفحه : ۲ از ۲

تاریخ بازبینی: ۹۲/۱/۱ یاد ر صورت ابلاغ دستورالعمل جدید

۳. در اتاقهای عمل و هنگام پانسمان، گارژنگ و استفاده از وسایل حفاظت فردی، طبق استاندارد انجام می شود.

۴- پوشیدن گان تمیز برای محافظت پوست و جلوگیری از آلوده شدن لباس حین انجام اعمال تهاجمی و فعالیت های مراقبت از بیمار که احتمال پاشیده شدن یا تولید خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی وجود دارد یا باعث آلوده شدن لباس می گردد، توصیه می شود .

۵. هنگام انجام اعمال تهاجمی و فعالیت های مراقبت از بیمار که احتمال ایجاد یا پاشیدن خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی وجود دارد پوشیدن ماسک و محافظ چشم یا صورت استفاده می شود.

۶. در هنگام انجام مراقبت هایی که احتمال تماس با خون و ترشحات بهار می رود طبق استاندارد از دستکش و گان استفاده می شود.

۷. دستکش فقط برای ارائه خدمات به یک بهار و در صورت احتمال تماس با خون، مایعات بدن، ترشحات، مواد دفعی و وسایل آلوده استفاده می شود و برای شروع مراقبت از بهار بعد تعویض می شود. شایان ذکر است شستن دست ها قبل از پوشیدن دستکش و پس از در آوردن آن نیز انجام می شود .

تهیه کننده نسخه اصلی : کمیته بهبود کیفیت و اعتبار بخشی خدمات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران - کمیته کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی تهران

تأیید کننده نسخه اصلی: مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول نظارت	مسئول آموزش	معیار پایش	دفعات تواتر پایش	زمان گزارش دهی
سوپروایزر بالینی سوپروایزر کنترل عفونت	سوپروایزر آموزشی سوپروایزر کنترل عفونت	چک لیست	هر ۶ ماه	پایان هر ۶ ماه

منابع:

۱. وهابی، حسین. امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان ۱۳۸۵
۲. سایت گسترش صنعت
۳. وبلاگ بهداشت محیط و رهنمودهایی برای حفظ بهداشت و ایمنی کارکنان
۴. وبلاگ مدیریت اثر بخش و رهبری در پرستاری و مامایی
۵. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی

راهنمای کاربردی کنترل عفونت در بیمارستان

Guideline for ISOLATION Precaution in Hospitals200